



BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 8/2025 del 11/06/2025

Fase fenologica. Alcune varietà stanno raggiungendo la fase di chiusura grappolo; la croatina ha avuto una allegazione irregolare, si trova ancora nella fase di grano di pepe e il grappolo è potenzialmente più soggetto ad infezioni di peronospora.

Peronospora. La Peronospora sta facendo la sua apparizione nei vigneti abbandonati ma anche in quelli trattati, soprattutto in quelli trattati con cadenze allungate con presenza di macchie di peronospora a mosaico che può aver infettato anche qualche grappolo. A differenza con la passata stagione questo ultimo periodo di tempo stabile, temperature massime vicino ai 30° e bagnature notturne non prolungate non stanno favorendo lo sviluppo di nuove infezioni; **fare attenzione alla presenza di macchie d'olio sporulate** che possono sviluppare nuove infezioni secondarie, soprattutto nei fondivalle: bastano le bagnature notturne. **Mantenere la massima attenzione: è ancora alto il rischio di una progressione della peronospora.** Si raccomanda di ripristinare la protezione della vegetazione allo scadere del turno del trattamento precedente, privilegiando l'impiego di p.a. endoterapici (*citotropici, traslaminari e/o sistemici*) preferibilmente nelle formulazioni contenenti partner caratterizzati da spiccata affinità con le cere dell'acino. Valutare la possibilità di abbinare o usare a supporto prodotti che assorbono l'umidità come *la zeolite, la polvere di roccia*; si raccomanda il rispetto dell'intervallo minore previsto in etichetta per i prodotti impiegati e di usare volumi d'acqua importanti per bagnare bene soprattutto la zona grappolo e rendere più efficace anche il trattamento insetticida.

Oidio. Il rialzo delle temperature medie crea la situazione ottimale per l'attività dell'oidio. Quindi si consiglia di miscelare un prodotto sistemico (non lo stesso per più di 3 volte all'anno) con un prodotto di copertura zolfo bagnabile a 2-4 kg/ha. In caso di accertata presenza di infezioni in atto è consigliabile privilegiare l'impiego di prodotti a base di *meptyldinocap o spiroxamina*.

Botrite. Valutare la possibilità di effettuare, prima della chiusura dei grappoli, un trattamento specifico sulle varietà sensibili alla muffa grigia, avendo cura di garantire un'adeguata bagnatura ai grappoli.

Tignoletta. E' iniziato il volo della seconda generazione della tignoletta con catture importanti.

Scaphoideus titanus. Il Servizio Fitosanitario Regionale ha comunicato le date per **i due trattamenti obbligatori contro la scafoideo vettore della Flavescenza Dorata della vite: il primo dal 12 al 23 giugno, il secondo dal 26 giugno al 7 luglio.**

Varie.

- Portare a termine la palizzata dei germogli e iniziare la cimatura. Diventa importante liberare i grappoli per migliorare il microclima e meglio proteggerli con i trattamenti.
- **Si raccomanda di eseguire la trinciatura delle erbe infestanti prima di procedere all'esecuzione dei trattamenti insetticidi volti al controllo delle popolazioni di Scaphoideus Titanus, allo scopo di salvaguardare gli insetti pronubi, utili.**
- **Si consiglia di trinciare l'erba dei terreni incolti e delle rive vicini a vigneti in produzione entro la fine maggio primi giorni di giugno, per evitare di spostare eventuali insetti nocivi alla vite, dall'incolto al vigneto.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola cel. 3387504596, Federico cel. 3385828793