



BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 9/2026 del 11/06/2026

Fase fenologica. Tutte le varietà stanno raggiungendo la fase di chiusura grappolo. Da ingrossamento acini a chiusura grappolo, queste due fasi se le condizioni climatiche sono ottimali, si sviluppano in poco tempo.

Peronospora. Il ritorno a temperature medio alte attorno ai 30° e poche piogge sono i nostri migliori alleati contro la peronospora; **fare attenzione alla presenza di macchie d'olio** che possono sviluppare nuove infezioni secondarie, soprattutto nei fondivalle, bastano le bagnature notturne. **Mantenere ancora attenzione, in questa fase è ancora alto il rischio di infezioni.** Si raccomanda di ripristinare la protezione della vegetazione allo scadere del turno del trattamento precedente, privilegiando le formulazioni contenenti partner caratterizzati da spiccata affinità con le cere dell'acino. Valutare la possibilità di abbinare o usare a supporto prodotti che assorbono l'umidità e proteggono dalle scottature, *la zeolite, la polvere di roccia*; si raccomanda di usare volumi d'acqua importanti per bagnare soprattutto la zona grappolo e rendere più efficace anche il trattamento insetticida.

Oidio. Il rialzo delle temperature medie crea la situazione ottimale per l'attività dell'oidio. Quindi si consiglia di miscelare un prodotto sistemico (non lo stesso per più di 3 volte all'anno) con un prodotto di copertura zolfo bagnabile a 2-4 kg/ha. In caso di accertata presenza di infezioni in atto è consigliabile privilegiare l'impiego di prodotti a base di *meptyldinocap o spiroxamina*.

Botrite. Valutare la possibilità di effettuare, prima della chiusura dei grappoli, un trattamento specifico sulle varietà sensibili alla muffa grigia, avendo cura di garantire un'adeguata bagnatura ai grappoli.

Popillia Japponica. Nei vigneti si vede la presenza di alcuni esemplari di Popillia

Tignoletta. Le catture del volo della seconda generazione della tignoletta sono in aumento; è difficile individuare il picco del volo, disturbato dai trattamenti effettuati contro lo scafoideo.

Scaphoideus titanus. Il Servizio Fitosanitario Regionale ha comunicato le date per **i due trattamenti obbligatori contro la scafoideo vettore della Flavescenza Dorata della vite: il primo dal 02 al 14 giugno, il secondo dal 17-29 giugno, 3 trattamenti per le aziende biologiche da effettuare nella stesso periodo dal 02 al 29 giugno.**

Varie.

- **Importante: per combattere sia lo scafoideo, che la tignoletta e la popillia japponica, scegliere un p.a. indicato per la lotta a questi due abitanti indesiderati dei nostri vigneti**
- Terminata la palizzata dei germogli, iniziare la cimatura. Diventa importante liberare la zona grappoli per migliorare il microclima e meglio proteggerli con i trattamenti.
- **Si raccomanda di eseguire la trinciatura delle erbe infestanti prima di procedere all'esecuzione dei trattamenti insetticidi volti al controllo delle popolazioni di Scaphoideus Titanus, allo scopo di salvaguardare gli insetti pronubi, utili.**
- **E' possibile segnalare la presenza di vigneti abbandonati non trattati al Servizio Agricoltura-Parco del Comune di San Colombano indicando foglio-mappale e proprietario del terreno.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola cel. 3387504596, Federico cel. 3385828793
Bollettino realizzato dal comune di San Colombano al Lambro in collaborazione con il Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano
LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA E' COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE